

Шифр МКХ 10	РОБОЧИЙ ДІАГНОЗ	ПРИМІТКА
I 11	Гіпертонічна хвороба, (I, або II, або III) ст. Неускладнений гіпертензивний криз.	Стадія гіпертонічної хвороби підтверджується даними об'єктивного обстеження (зміщення лівої границі серця вліво), або ЕКГ, або даними інших методів дослідження органів мішеней ГХ та анамнестичними даними.
I 11, I 50	Гіпертонічна хвороба, III ст. Неускладнений гіпертензивний криз. Гіпертензивне серце. СН IIб.	Якщо до загально мозкових скарг та вегетативних змін приєднуються скарги пов'язані з серцевою недостатністю або вони виявлені при обстеженні, та надається с цього приводу допомога.
I 11, I 67-4	Гіпертонічна хвороба, III ст. Ускладнений гіпертензивний криз. Гостра гіпертонічна енцефалопатія.	
I 11, I 50.1	Гіпертонічна хвороба, III ст. Ускладнений гіпертензивний криз. Інтерстиціальний або альвеолярний набряк легень. Гіпертензивне серце. СН IIА.	
I 11, I 67.	Гіпертонічна хвороба, II ст. Неускладнений гіпертензивний криз. Дисциркуляторна енцефалопатія, II або III ст.	
I 20. I 11	ІХС. Стабільна стенокардія напруження, II-III-IV ф. кл. Дифузний (постінфарктний) кардіосклероз. СН II або III ст. Гіпертонічна хвороба, II або III ст. Неускладнений гіпертензивний криз.	Якщо клінічна картина ГК доповнюється нападами ангінозного болю, які не відрізняються від нападів стенокардії у хворого коли АТ не підвищений.

I11,G4 5.8	Гіпертонічна хвороба, II-III ст. Ускладнений гіпертензивний криз. Транзиторна ішемічна атака. Дисциркуляторна енцефалопатія, II або III ст.	
I63.90,I 11	Гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом (час, дата). Гіпертонічна хвороба, III ст. Ускладнений гіпертензивний криз.	
I11,I15. 2	Хронічний пієлонефрит. Вторинна артеріальна гіпертензія. Неускладнений гіпертензивний криз.	
I20.8	ІХС. Стабільна стенокардія напруження, II-III-IV ф. кл. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. СНІІ-III ст.	Діагноз ІХС (її форм) ставиться на першому місці в поєднанні її з ГХ.
I20.8	ІХС. Стенокардія, що виникла вперше. Дифузний кардіосклероз. СНІІ-III ст.	
I20.8	ІХС. Прогресуюча стенокардія. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. СН II або III ст.	
I20.8	ІХС. Рання постінфарктна стенокардія. Постінфарктний кардіосклероз. СН II або III ст.	
I20-I22	ІХС. Гострий коронарний синдром без елевації ST. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. СН II-III ст.	Клініка тривалого ангінозного нападу супроводжується ЕКГ яка без змін, або депресією ST чи T(-).
I21-I22	ІХС. Гострий коронарний синдром з елевацією ST. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. СН II-III ст.	
I21-I22 I26-I28	ІХС. Гострий коронарний синдром з елевацією ST. Кілір II-II-IV. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. <i>(Порушення ритму серця, якщо воно спостерігається)</i> . СН II або III ст.	
I44-I49	ІХС. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. <i>Вид порушення ритму серця. СН II або III ст.</i> Наприклад: ІХС. Дифузний кардіосклероз. Персистуюча форма фібриляції передсердь. СНІА. ІХС. Постінфарктний (2010р.) кардіосклероз. Постійна форма фібриляції передсердь, тахісистолія (брадісистолія). СН ІІБ.	

I 24.9	IХС. Гострий коронарний синдром? Дифузний кардіосклероз. СН І.	
I20I44- I49	IХС. Стабільна стенокардія напруження II-III- IVф.кл. (або прогресуюча стенокардія). Дифузний(абопостінфарктний кардіосклероз). Вид порушення ритму серця. СНII-IIIст.	
I44-I49	IХС. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. Вид порушення ритму серця. Аритмічний шок.СН II-IIIст.	
I44-I49	WPW – синдром. Пароксизм вузлової ортодромної (або антидромної)тахікардії.	
I44-I49	Ідіопатична форма аритмії. Пароксизмсуправентрикулярної реципрокної (або ектопічної) тахікардії.	Якщо невідома причина, яка спонукає до виникнення порушення ритму серця.
I40.9	Гострий вірусний (післягрипозний) міокардит, перебіг середньої важкості. Суправентрикулярна екстрасистолія СН ІА.	
I42.0	Дилатаційна кардіоміопатія. Постійна форма фібриляції передсердь, тахісистолія. СН ІБ.	
F45.3	Нейроциркуляторна дистонія з гіпертензивним (або Кардіальним, або гіпотензивним, або змішаним) синдромом, I-II-III ступінь.	
J12-J18	Негоспітальна пневмонія нижньої частки правої легені, середньо тяжкий перебіг. ЛН І.	
J12-J18	Негоспітальна пневмонія нижньої частки правої та лівої легень,тяжкий перебіг. ЛН ІІ.	«Малі» критерії тяжкого перебігу: -частота дихання 30 і більше за 1хв.; -порушення свідомості; -сатурація 90% і менше; -САТ 90мм.рт.ст. та менше; -двобічне ураження легень. «Великі» критерії- потреба в ШВЛ,шок,

		швидке прогресування процесу. Про тяжкий перебіг свідчить наявність двох «малих» або одного «великого» критерію.
J12-J18	Негоспітальна пневмонія нижньої та середньої часток правої легені, тяжкий перебіг. Правобічний плеврит. Інфекційно-токсичний (септичний, бактеріальний) шок ЛН III.	
J12-J18	Негоспітальна пневмонія нижньої частки лівої легені та нижньої та середньої часток правої легені, тяжкий перебіг. Респіраторний дистрес-синдром. ЛН III.	
J45	Бронхіальна астма, легкий персистуючий перебіг. Легкий ступінь загострення. ЛН I.	
J45	Бронхіальна астма, персистуючий перебіг середньої тяжкості, загострення середньої тяжкості. ЛН I або II.	
J45	Бронхіальна астма, тяжкий персистуючий перебіг, тяжке загострення. ЛН III.	
J45	Бронхіальна астма, тяжкий персистуючий перебіг, тяжке загострення, гіпоксемічна кома. ЛН III.	
J45	ХОЗЛ, II-III ст., перебіг середньої тяжкості, неінфекційне (інфекційне) загострення середньої тяжкості. ЛН I-II.	Легенева недостатність ступені тяжкості: I ст. -задишка, при звичайному фізичному навантаженні; II ст. -задишка при незначному фізичному навантаженні; III ст. -задишка в стані спокою.
J45	ХОЗЛ, III ст., тяжкий перебіг, неінфекційне (інфекційне) тяжке загострення. ЛН II-III. ХЛС. СН ІА.	

J03	Катаральна (фолікулярна, лакунарна) ангіна, легкий (середньої тяжкості, тяжкий) перебіг.	
J11	Грип, (легкий, середньої тяжкості, тяжкий) перебіг.	
J06	ГРВІ, (легкий, середньої тяжкості) перебіг. Лихоманка.	Гіпертермія (пірексія) - стан, при якому процес терморегуляції не порушений, а підвищення температури обумовлене дією зовнішніх умов (перегрівання). Лихоманка - підвищення температури в результаті змін у центрі терморегуляції внаслідок дії ендогенних факторів (інфекції, пухлини, інше).
L50.0	Медикаментозна. (Харчова, Інсектна) алергія. Системна або локалізована алергічна реакція. Легкий. (середньої тяжкості, тяжкий) ступінь. Генералізована (локалізована) кропив'янка та ангіоневротичний набряк. Наприклад: Інсектна алергія. Локалізована алергічна реакція, легкий ступінь. Локалізована кропив'янка. Алергія невідомої етіології. Системна алергічна реакція, середньої тяжкості. Генералізована кропив'янка.	
T8.0- T8.2	Медикаментозна алергія. Системна алергічна реакція, тяжкий ступінь. Анафілактичний шок, типова форма.	
E10.0- E14.0	Цукровий діабет, I або II тип, (легкий, середньої тяжкості, тяжкий) перебіг, (компенсація, субкомпенсація, декомпенсація), (наявність ангіо- та нефропатій). Гострі ускладнення. Наприклад: Цукровий діабет, II тип, перебіг середньої тяжкості, субкомпенсація. Гіпоглікемія.	Ангіо- та нейропатії відображати в діагнозі в разі, якщо присутні скарги хворого на ці ураження, або на них вказують дані об'єктивного обстеження.

	Цукровий діабет, I тип, тяжкий перебіг, декомпенсація. Кетоацидотична кома.	
O 00	Правобічна позаматкова вагітність.	
O 03	I Вагітність 10-11 тижнів. Загроза переривання вагітності в 10-11 тижнів.	
O 06	I Вагітність 15 тижнів. Кримінальний неповний пізній аборт в 15 тижнів вагітності. Пельвіоперитоніт. Інфекційно-токсичний шок I ст.	
N39	Перекрут ніжки кісти правого яєчника.	
N39	Апоплексія лівого яєчника.	
N39	Порушення оваріо-менструального циклу. Метрорагія.	
O 80.0	III Вагітність 39-40 тижнів. II строкові пологи в 39-40 тижнів вагітності, I період пологів.	
O 60-O 75	II Вагітність 36 тижнів. II передчасні пологи в 36 тижнів. I період пологів. Передчасне відходження навколоплідних вод.	
O 60	II Вагітність 32 тижнів. Загроза I передчасних пологів у 32 тижні вагітності. Водянка вагітних I ступеня.	
O 10-O 16	II Вагітність 34 тиж. Загроза II передчасних пологів в 34 тижня вагітності. Преєклампсія вагітних I ступеня.	
O 15	II Вагітність 38 тижнів. II строкові пологи в 38 тижнів вагітності. I період пологів. Еклампсія вагітних.	
O 80.8	I Вагітність 40 тижнів. I стрімкі позалікарняні пологи в 26 років, II період пологів.	
O 80.8 O 72	I Вагітність 40 тижнів. I стрімкі позалікарняні пологи в 40 тижнів вагітності. Ранній післяпологовий період. Рання післяпологова гіпотонічна кровотеча. Розриви промежини I ст..	
O 44-O 4	I Вагітність 33 тижні. I період I передчасних пологів в 32 тижні вагітності. Передчасне відшарування плаценти.	
O 44-O 4	II Вагітність 16 тижнів. Крайове передлежання плаценти.	

O69.0	I Вагітність 38 тижнів. I період I строкових пологів в 38тиж.вагітності. Передчасне відходження навколоплідних вод. Випадіння пуповини.	
O 84	II Багатоплідна вагітність (двійня) 37-38тиж. I період I строкових пологів в 38 тижнів вагітності. Сідничне передлежання.	
O71.0- O71.1	II Вагітність 38 тиж. I період I строкових пологів в 38 тижнів вагітності. Бурна дискоординована пологова діяльність. Загроза розриву матки.	
N70- N77	Гострий двобічний сальпінгоофорит.	
N39	Альгодисменорея.	
N49.2	Гострий бартолініт.	
	Порушення оваріо-менструального циклу. Клімактерична маткова кровотеча.	
N61	Серозний мастит лівої молочної залози.	
T15- T19	Стороннє тіло піхви.	
T01.9	Забійні рани ділянки зовнішніх статевих органів.	
O 85- O92	Післяпологовий період 7 діб. Післяпологовий метроендометрит. Розходження швів в ділянці зовнішніх статевих органів після епізіотомії.	
N23	СКХ. Сечокислий діатез. Напад правобічної ниркової кольки. Вторинний гострий правобічний пієлонефрит.	
N33	Гіперплазія передміхурової залози IIст. Гостра затримка сечі.	
N33	Са тіла матки з метастазами у сечовий міхур III ст., IV кл. гр. Гостра затримка сечі.	
N39	Правобічний гострий гнійний пієлонефрит. Гостра ниркова недостатність IIст. Бактеріємічний шок II ст..	
N39	Хронічна хвороба нирок, Iст.Неускладнений пієлонефрит,переважно правобічний,загострення.	
N39	Хронічна хвороба нирок, IIст., ускладнений (СКХ) пієлонефрит, рецидивуючий перебіг, загострення. Вторинна артеріальна гіпертензія.	

N45	Гострий орхіепідидиміт.	
N50	Гострий парафімоз.	
N50	Гострий простатит.	
T15- T19	Стороннє тіло уретри.	
	Тупа травма живота. Розрив сечового міхура.	
K35	Гострий деструктивний апендицит. Розлитий перитоніт.	
K81.0	Жовчно-кам'яна хвороба. Гострий калькульозний холецистит. Механічна жовтяниця.	
I84	Набутий зовнішній геморої. Тромбоз гемороїдального вузла.	
K25	Гостра медикаментозна (аспіринова) виразка шлунку. Шлунково-кишкова кровотеча.	
K73-74	Цироз печінки змішаної етіології в ст.декомпенсації. Портальна гіпертензія. Кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу. Геморагічний шок, II-III ст.	
K40- K46	Защемлена пупочна грижа. Гостра кишкова непрохідність.	
M54.4	Хронічна люмбалгія на тлі остеохондрозу поперекового відділу хребта, сильно виражений больовий синдром.	
M42	Остеохондроз шийного відділу хребта з цервіко - краніалгією.	
T20- T32	Термічний опік окропом I-II ст. обличчя та верхніх кінцівок площею 18%.	
T52.2	Гостре отруєння сірчаною кислотою. Хімічний опік слизових оболонок порожнини рота та стравоходу.	
T59	Інгаляційне отруєння невідомою речовиною.	
T36- T50	Підозра на отруєння грибами.	Наказ № 202 по станції від 20.07.2011р.
T71	Механічна асфіксія від стиснення шиї зашморгом при повішанні.	
T75	Утоплення в прісній воді. Постгіпоксична енцефалопатія.	
S72.1	Закритий перелом лівої стегнової кістки в середній третині.	

T08-14	Відкритий перелом нижньої треті правої стегнової кістки та середньої третини обох кісток правої гомілки.	
T00-07	Політравма. ЗЧМТ. Забій головного мозку легкого ст. Забій м'яких тканин обличчя. Закритий перелом обох кісток лівого передпліччя в нижній третині.	
S02.1	Відкрита проникаюча ЧМТ. Забій головного мозку. Внутрішньомозкова гематома в лівій півкулі головного мозку. Відкритий перелом основи черепа. Носова лікворея. Забійна рвана рана лівої тім'яно-скроневої ділянки.	
W32	Вогнепальне кульове наскрізне поранення правої половини грудної клітки проникаюче в праву плевральну порожнину з ушкодженням правої легені, 3 ребра справа та правої лопатки. Правобічний гемоторакс.	
T08-14	Тупа травма живота. Забій передньої черевної стінки. Розрив селезінки? Геморагічний шок II-III ст.	
T08-14	Ножове поранення живота. Проникаюча колота рана З пошкодженням печінки. Внутрішня кровотеча. Геморагічний шок II-III ст.	
T59	Гостре інгаляційне отруєння чадним газом (або продуктами горіння побутового газу).	
R96	Раптова серцева смерть (аритмічна), незворотна (фібриляція шлуночків о 15 ⁰⁰ , 15 ⁰⁵ , 15 ¹⁰ , ЕМД о 15 ¹⁵ , 15 ²⁰ , асистолія о 15 ²⁵ , 15 ³⁰). Констатована смерть о 15 ³⁰ 18.06.2013р.	
J45R96	ХОЗЛ, II-III ст., важкий перебіг, важке неінфекційне загострення. ЛН II-III. Зупинка серця (о 15 ⁰⁰ 18.06.13р.), незворотна. Констатована смерть о 15 ³⁰ 18.06.13р.	
R96.0	Основні ушкодження, викликані дією зовнішнього фактору. Зупинка кровообігу о 15 ⁰⁰ 18.06.13р., незворотна. Констатована смерть о 15 ³⁰ 18.06.13р.	
G40	Епілепсія. Стан після нападу судом (або стан після серії	Коли є документальні або анамнестичні

	нападів судом).	дані на наявність у хворого епілепсії.
G41	Епілепсія. Епілептичний статус.	
G40	Стан після нападу судом неуточненої етіології.	Коли невідома причина судом або напад судом виник на тлі одноразового вживання великої кількості алкоголю.
F10.03	Стан відміни вживання алкоголю (абстинентний синдром).	
F10.03	Стан відміни вживання алкоголю(абстинентний с-м). Алкогольна епілепсія. Стан після нападу судом.	Напад судом на тлі регулярного вживання алкоголю,яке підтверджено анамнезом або документально.
F10.04	Абстинентний синдром. Алкогольний (або абортивний) делірій.	
F10.02	Алкогольне сп'яніння.	
F10.00	Отруєння алкоголем, прекома (кома).	
F10.05- F10.09	Алкогольний параноїд (або галюциноз).	
F11- F14	Опіатна наркоманія. Стан передозування опіатами.	
F11- F14	Синдром залежності внаслідок вживання канабіоїдів. (продуктів коноплі).Стан сп'яніння.	
F11- F14	Стан відміни вживання сібазону. Синдром залежності.	
F15- F19	Розлад психіки та поведінки на тлі вживання невстановленого препарату (речовини) або - Розлад психіки та поведінки на тлі вживання сібазону.	
F20.9	Шизофренія неуточнена.	
F20- F25	Гострий маячний(або шизофреноподібний) розлад.	
F28- F29	Гострий поліморфний психотичний розлад.	За наявності вперше виниклогонетривалого(до моменту огляду)психозу.
F28- F29	Розлади психіки та поведінки внаслідок інволюції(або на тлі судинного ураження ЦНС).	

F00- F09	Деменція на тлі перенесеного повторного ішемічного інсульту.	
F00- F09	Хвороба Альцгеймера.	
F00- F09	Розлади пам'яті, особистості та поведінки на тлі судинного ураження ЦНС. Загальний атеросклероз. Атеросклероз судин головного мозку.	
F00- F09	Вроджене недоумство в стадії (дебільності, або імбецильності, або ідіотії).	
F30- F39	Маніакально-депресивний психоз. Гіпоманіакальний стан.	Для розладів психіки, де переважають афективні (емоційні) розлади.
F30- F39	Маніакально-депресивний психоз. Депресивний с-м. Суїцидальні висловлювання.	